

TOUX CONTAGIEUSE CANINE

TOUX DU CHIEN



6. Un chien porteur de la toux contagieuse canine peut également contaminer un chat.

- Vrai
- Faux

Vrai.

Bordetella bronchiseptica est la plus importante bactérie responsable de la toux contagieuse canine, mais aussi du coryza (grippe du chat) chez les chats. Les chiens et les chats d'une même famille peuvent se contaminer mutuellement.



7. La toux contagieuse canine se manifeste principalement au printemps.

- Vrai
- Faux

Faux.

La toux contagieuse canine survient à toute saison, tout au long de l'année. Une vaccination annuelle contre la toux contagieuse canine, avec une période de protection d'un an, est donc recommandée.



8. Quels sont les symptômes ou complications possibles de la toux contagieuse canine ?

- Toux intense et irritante
- Mal de gorge
- Tendance aux vomissements
- Diarrhée
- Fièvre
- Ne peut/ne veut pas manger
- Pneumonie

À l'exception de la diarrhée, toutes les réponses sont correctes.



- Toux intense et irritante
- Mal de gorge
- Tendance aux vomissements
- Diarrhée
- Fièvre
- Ne peut/ne veut pas manger
- Pneumonie

9. La vaccination contre la toux contagieuse canine est particulièrement importante pour les chiots.

- Vrai
- Faux

Vrai.

Un chiot est plus vulnérable aux complications de la toux contagieuse canine. De plus, il est conseillé aux chiens qui sont infectés d'éviter les autres chiens pendant un certain temps. Ce n'est pas souhaitable pour un chiot, car les contacts avec les autres chiens sont une partie importante de sa socialisation.




AVEZ VOUS APPRIS DE NOUVELLES CHOSES AU SUJET DE LA TOUX CONTAGIEUSE CANINE ?

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

MyPet
be.mypet.com/fr





1. La toux du chenil/toux contagieuse canine ne peut s'attraper que dans un chenil.

- Vrai
 Faux



2. Vous pouvez protéger votre chien contre la toux contagieuse canine par un vaccin administré sous forme de gouttes dans le nez ou dans la bouche ou encore par injection. Il est conseillé d'utiliser une vaccination par le nez.

- Vrai
 Faux



3. Si un chien éternue immédiatement après l'administration d'un vaccin par voie nasale contre la toux contagieuse canine la vaccination ne sera pas aussi efficace.

- Vrai
 Faux



4. Si un chien a été vacciné contre la toux contagieuse canine, il ne peut plus contracter cette maladie.


- Vrai
 Faux

5. Si votre chiot a contracté la toux contagieuse canine le meilleur conseil est de ne pas fréquenter l'école d'éducation canine pendant 6 semaines.

- Vrai
 Faux

Faux.

Le nom "toux du chenil" suggère à tort qu'un chien ne peut attraper cette maladie que dans les pensions ou les chenils. C'est pourquoi la maladie est aujourd'hui appelée toux contagieuse canine. Dans le diagramme de droite, vous trouverez les endroits les plus courants où un chien peut la contracter.



Vrai.

Les anticorps assurent une protection. Votre chien reçoit des anticorps dans le sang suite à une instillation de gouttes dans le nez, la bouche, ou suite à une injection. Mais par l'administration de gouttes dans le nez, il aura également des anticorps présents sur la muqueuse nasale. Une double protection donc même sur le lieu de l'infection !



Faux.

Pour renforcer l'immunité, le vaccin doit adhérer à la muqueuse nasale. Lorsque le vaccin intranasal atteint la muqueuse nasale, cela peut provoquer un réflexe d'éternuement. Mais il restera toujours suffisamment de vaccin pour assurer la protection.



Faux.

De multiples virus et bactéries peuvent provoquer la toux contagieuse canine. Il est possible de vacciner contre les deux principaux agents pathogènes (para-influenza et *Bordetella bronchiseptica*), mais un chien pourra toujours contracter une autre forme de la toux contagieuse canine.

Cependant, les symptômes après la vaccination seront généralement beaucoup plus légers.



Vrai.

Un chiot atteint de la toux contagieuse canine peut infecter d'autres chiens. Même si le chiot a cessé de tousser, il reste une source d'infection pour les autres chiens pendant des semaines.

